

Fiche N°14


Le PICC Line

Définitions et explications

Il s'agit d'un cathéter central inséré par une veine périphérique du bras dont l'extrémité distale se situe dans une grosse veine à l'entrée du cœur, ce qui supprime tous les effets indésirables créés par la chimiothérapie sur les petites veines du bras. Il permet donc de préserver le capital veineux.

Il est utilisé pour l'administration des médicaments dans la circulation générale et pour faire des prélèvements sanguins y compris à domicile, sous réserve du cabinet infirmier qui vous prend en charge.

La pose de PICC Line est faite dans une unité spécialisée au CHLS qui s'appelle l'UAV (Unité Accès Vasculaire). Le geste dure 15 à 30 mn, en position allongée, sous anesthésie locale afin que la pose soit indolore. Des médicaments pourront vous être prescrits avant le geste en cas d'anxiété. N'hésitez pas à nous le demander.



Une fois le cathéter implanté, un pansement adhésif recouvert d'un pansement transparent permet de le maintenir en place. Celui-ci devra être refait une fois par semaine par un infirmier à domicile. Lors de la réfection du pansement l'infirmier procédera à un rinçage systématique du cathéter.

Le Picc Line est conçu pour rester plusieurs mois en place. Son retrait est complètement indolore.

Un carnet de suivi vous est remis après la pose pour faciliter son utilisation à domicile.

Conseils thérapeutiques

Tant que le cathéter est en place, les baignades sont interdites, la douche est autorisée toutefois faites preuve d'une grande vigilance afin de garder le pansement au sec.

Si le pansement est décollé, humide ou souillé, ne le changez pas seul. Vous risquez d'arracher le cathéter. Prenez plutôt contact avec le cabinet d'infirmière à domicile.

La présence du cathéter ne vous empêche pas de vaquer à vos occupations, cependant évitez de pratiquer des sports de contact ou des activités trop exigeantes pour votre bras.

Si vous avez peur « d'arracher » accidentellement le PICC Line, vous pouvez enfiler un manchon par-dessus le pansement hermétique. Veillez seulement à garder ce manchon propre.



ATTENTION :

Les PICC Line sont parfois source d'infection ou d'obstruction de la veine. Une douleur, rougeur ou un gonflement du bras ainsi qu'un écoulement au point de ponction doivent vous faire consulter.

Dans ce cas, appelez votre cabinet d'infirmière libérale ou signalez le lors d'un passage en hôpital de jour.

Quand nous contacter?

Si vous avez des questions ou des symptômes anormaux notamment à l'endroit du point de ponction de votre PICC Line n'hésitez pas à nous contacter au 04 78 86 44 01.